



**A nombre de la Alianza Neonatal les damos las  
gracias por participar en el WEBINAR**

**Cuidados del recién nacido en época de la  
COVID-19**

# Recomendaciones

- No se olviden de apagar sus micrófonos para no perjudicar a los presentadores
  - Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas después de las dos presentaciones.
- Por favor incluyan sus preguntas en el Chat para que podamos ordenarlas y responderlas o soliciten la palabra

# Agenda

12:00-12:05. Apertura. Deborah Horowitz. Asesora Técnica de Salud Materna y Neonatal (USAID). A nombre de la Alianza Neonatal

12:05-12:25. COVID-19 e impacto perinatal a la luz de la evidencia. Dr. Pablo Durán. Asesor Regional de Salud Perinatal (CLAP/OPS(OMS))

12:25-12:45. Preguntas frecuentes sobre la salud materna, neonatal y del niño y la COVID-19. Ralph Midy. UNICEF

12:45 -13:15 Preguntas y respuestas modera Bertha Pooley por la Alianza Neonatal

13:15 – 13:30 Conclusiones

# **COVID-19 e impacto perinatal a la luz de la evidencia**

**Dr. Pablo Durán**  
**Asesor Regional de Salud Perinatal**  
**(CLAP/OPS(OMS))**

## Atención del recién nacido

- Es esencial brindar atención interdisciplinaria con especialistas obstetras, perinatólogos, neonatólogos, infectólogos, laboratoristas y de cuidados intensivos a las mujeres y recién nacidos con sospecha o confirmación de infección por COVID 19 previo, en el parto y luego del nacimiento
  - se recomienda contar con el equipamiento específico, personal adecuadamente capacitado para implementar en forma inmediata medidas de reanimación, apoyo vital y tratamiento específico y la posibilidad de referencia a unidades de cuidados intensivos para la mujer y/o el recién nacido.
  - Estas recomendaciones no son específicas para la condición abordada, sino que permiten brindar atención de calidad en el momento de la atención del nacimiento.

# Que nos muestra la evidencia hasta el momento

- 20 publicaciones científicas, 222 recién nacidos (China, Australia, España)
  - 13 recién nacidos con resultados positivos por RT-PCR
    - 3 re-hospitalizaciones
    - 1 reportado como falso negativo
  - 2 reportes (7 recién nacidos) con resultados no consistentes
  - Aislamiento y separación de la madre (altamente frecuente)
  - Restricciones para el amamantamiento
  - Cuadros clínicos leves/moderados
  - Promedio de estancia variable

# Lactancia y alimentación del lactante:

- Todas las mujeres embarazadas y puérperas con infección por COVID-19 deben recibir información y asesoramiento sobre el cuidado y alimentación segura a brindar a los lactantes, y las medidas apropiadas de PCI para prevenir la transmisión del virus COVID-19 por contacto estrecho.
- No se han hallado RNA viral en leche materna hasta el momento

- El sostenimiento de la lactancia materna es esencial.
- Es esencial recordar que:
  - Observar una buena higiene respiratoria mientras amamanta a su bebé, usando mascarilla, si hay mascarillas disponibles;
  - Lavarse las manos antes y después de tocar el bebé;
  - Limpiar y desinfectar de manera rutinaria las superficies que haya tocado.
- Fortalecer el apoyo para alimentarlo con leche materna de alguna manera posible, viable y aceptable, cuando la lactancia materna no sea posible, como:
  - Extracción de leche
  - Relactación
  - Leche de donante humana

# Cuidados a recién nacido

- Valorar condiciones de riesgo y brindar la atención acorde al estado del recién nacido
- Adecuar la respuesta en el marco de una red de atención
- Promover el cuidado integral sin dejar de observar las medidas centrales de prevención
- Fortalecer al momento del egreso de la institución la promoción de la salud y la adherencia a medidas de prevención en el hogar
- Controles en salud e inmunización
- Signos de alarma y lineamientos para consultas

# **Preguntas frecuentes sobre la salud materna, neonatal y del niño y niña y COVID 19**

**Dr. Ralph Midy**  
**Especialista Regional de Salud Materna, Recién  
Nacido, Niñez/VIH, UNICEF**



# Preguntas frecuentes sobre la salud materna, neonatal y del niño y niña y COVID 19

Ralph Midy, especialista regional  
MNCH/VIH de UNICEF



# ¿Qué sabemos y que se recomienda con la evidencia conocida hasta hoy?

## ■ ¿Se debería hacer la prueba de COVID 19 a las mujeres embarazadas?

- Los protocolos de las pruebas y elegibilidad varían dependiendo en donde vive la mujer
- Las recomendaciones de la OMS es que toda mujer embarazada con síntomas de COVID 19 deberían ser priorizadas para las pruebas, ya que podrían necesitar algún tipo de cuidado especial

## ■ ¿Las mujeres embarazadas con prueba de COVID 19 positiva o con sospecha deben tener su parto con cesárea?

- No necesariamente. Se debe realizar una cesárea, solo cuando es clínicamente justificada
- El modo del parto y nacimiento debe ser una decisión individualizada, tomando en cuenta las preferencias de la mujer, en coordinación con las indicaciones obstétricas pertinentes.

Source: <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding>

## ¿Qué sabemos y que se recomienda con la evidencia conocida hasta hoy?...

### ■ **¿Están las mujeres embarazadas en mayor riesgo de contraer el COVID 19?**

- Al presente no hay evidencia de que tengan un mayor riesgo de contraer el COVID 19 o de presentar un riesgo mayor de complicaciones, que la población en general

### ■ **¿La mujer con COVID 19 positiva puede transmitir el virus al feto o al recién nacido/as?**

- Todavía no se conoce si se puede dar la transmisión vertical, ya sea al feto durante el embarazo o al recién nacido/a durante el parto

- A la fecha no se ha encontrado muestras del virus en el líquido amniótico o en la leche materna

[Source: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding](https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding)

# ¿Qué sabemos y que se recomienda con la evidencia conocida hasta hoy?...

## ▪ ¿Puede una mujer con COVID-19 dar lactancia materna?

- Si, la mujer COVID-19 -si así lo desea- puede dar de lactar a su bebé
- Se le debe apoyar para el contacto piel a piel y como debe compartir el cuarto con el recién nacido/a

### Se debería:

- Practicar **higiene respiratoria** durante el amamantamiento y **usar un barbijo/mascarilla** cuando esté disponible
- Lavarse las manos antes y después de tocar al recién nacido/a
- Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies del cuarto que haya tocado o manipulado

Source: <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding>

## ¿Cuales son las áreas claves para tomar en cuenta?

### ¿ Está la población y los Centros de Salud preparados?

- **Cómo podríamos ayudar a fortalecer:**
  - la prevención y control de la infección,
  - los cuidados en la comunidad y la familia,
  - los servicios de salud
  - minimizar el impacto secundario del COVID 19 para madres, recién nacidos/as niños y niñas
  - monitorear el impacto directo e indirecto del COVID 19 en recién nacidos y niños y niñas.

# Alianzas



Colectivo por la Salud Neonatal Perú




Alianza Neonatal de Paraguay

Alianza Neonatal de Republica Dominicana



ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA





**Muchas gracias!!**